

México, D.F. 5 de julio de 2005  
Boletín de Prensa

*El porcentaje representa la segunda mayor incidencia de abortos en la ciudad de México*

## **El 21 % de las mujeres que atienden por aborto los hospitales del DF, son adolescentes**

En el Distrito Federal, las jóvenes entre 15 y 19 años son un sector de la población que tiene un alto riesgo de aborto, pues representan el 21.6 por ciento de las mujeres que, por esta causa, han sido atendidas en hospitales de la Secretaría de Salud capitalina.

Así lo dio a conocer Norma Ubaldi Garcete, coordinadora del área de Información del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien dijo que ese porcentaje representa la segunda mayor incidencia de abortos en el DF, luego del grupo de mujeres de 19 a 24 años.

Durante el curso de Salud, Sexualidad y Salud Reproductiva, organizado por el Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental, de la Facultad de Medicina de la UNAM, Norma Ubaldi explicó que la relación entre adolescencia, embarazo y aborto se ve con frecuencia en nuestro país, y entre las causas de esta situación determinó la negación del ejercicio de la sexualidad en la adolescencia, los límites en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y en el acceso a métodos anticonceptivos modernos y prácticos.

Ante profesores de nivel bachillerato de la máxima casa de estudios, explicó que a pesar del amplio conocimiento entre las mujeres de los métodos anticonceptivos – 93 por ciento conoce de ellos--, sólo el 49 por ciento de las adolescentes que viven en pareja los utiliza. De ello se desprende que sean 366 mil el número de partos que tienen mujeres en este rango de edad, lo que representa el 17.2 por ciento del total del país.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud considera como embarazo adolescente o temprano aquel que ocurre entre los 15 y los 19 años de edad, y señala que la maternidad adolescente es considerada de alto riesgo, ya que los hijos de estas madres tienen mayor posibilidad de nacer con bajo peso, mayor mortalidad infantil y mayor tendencia al destete precoz, así como, ante la



inmadurez fisiológica, el riesgo de la mujer de perder la vida durante el embarazo y el parto. Todo ello constituye una causa de inequidad social, afirmó Ubaldi.

Para reducir el vínculo entre adolescencia y aborto, indicó, se debe respetar la confidencialidad en la educación sexual, los servicios de salud y en el acceso a los métodos anticonceptivos. Dijo, además, que es necesario establecer bajos costos y disponibilidad inmediata a los servicios de salud y métodos de anticoncepción. Pero sobre todo, agregó, poner énfasis en la libertad sexual y reproductiva de cada individuo.

Alonso Flores  
Información y Análisis

**Prensa:** Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 5658 6684/45, extensiones 230, 231 y 256